

OTC

乙类

维生素C片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：维生素C片

英文名称：Vitamin C Tablets

汉语拼音：Weishengsu C Pian

【成份】 本品每片含主要成份维生素C 100毫克。辅料为：淀粉、糊精、预胶化淀粉、羧甲纤维素钠、枸橼酸、硬脂酸、滑石粉。

【性状】 本品为白色或略带淡黄色片。

【作用类别】 本品为维生素类非处方药药品。

【适应症】 用于预防坏血病，也可用于各种急慢性传染疾病及紫癜等的辅助治疗。

【规格】 100毫克

【用法用量】 口服。

用于补充维生素C：成人一日1片。

用于治疗维生素C缺乏：成人一次1~2片，一日3次；儿童一日1~3片。至少服2周。

【不良反应】

1. 长期服用每日2~3克可引起停药后坏血病，故宜逐渐减量停药。
2. 长期应用大量维生素C可引起尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石。
3. 过量服用（每日用量1克以上）可引起腹泻、皮肤红而亮、头痛、尿频（每日用量600毫克以上）、恶心呕吐、胃痉挛。

【禁忌】 尚不明确。

【注意事项】

1. 不宜长期过量服用本品，否则，突然停药有可能出现坏血病症状。
2. 本品可通过胎盘并分泌入乳汁。孕妇服用过量时，可诱发新生儿产生坏血病。
3. 下列情况应慎用：（1）半胱氨酸尿症（2）痛风（3）高

剂型

片剂

草酸盐尿症(4) 草酸盐沉积症(5) 尿酸盐性肾结石(6) 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症(7) 血色病(8) 铁粒幼细胞性贫血或地中海贫血(9) 镰形红细胞贫血(10) 糖尿病(因维生素C干扰血糖定量)。

4. 如服用过量或出现严重不良反应,应立即就医。
5. 对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1. 口服大剂量维生素C可干扰抗凝药的抗凝效果。
2. 与巴比妥或扑米酮等合用,可促使维生素C的排泄增加。
3. 纤维素磷酸钠可促使维生素C代谢为草酸盐。
4. 长期或大量应用维生素C时,能干扰双硫仑对乙醇的作用。
5. 水杨酸类能增加维生素C的排泄。
6. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品参与机体内抗体及胶原形成,组织修补(包括某些氧化还原作用),苯丙氨酸、酪氨酸、叶酸的代谢,铁、碳水化合物的利用,脂肪、蛋白质的合成,以及维持免疫功能,羟化5-羟色胺,保持血管的完整,并促进非血红素铁的吸收。

【贮藏】遮光,密封保存。

【包装】口服固体药用高密度聚乙烯瓶装 100片/瓶;1000片/瓶

【有效期】18个月

【执行标准】《中国药典》2010年版二部

【批准文号】国药准字H50020036

【说明书修订日期】2010年09月08日

太极[®]西南药业股份有限公司

重庆市沙坪坝区天星桥21号

电话:(023)89855095 (023)89855589

传真:(023)89855598 邮编:400038

网址:<http://www.swp.cn>

如有问题可与生产企业联系